

RESUCRAGE

**ASSOCIATION DES
DIETETICIEN(NE)S
DU FINISTERE
ET DU MORBIHAN**

Téléphone :
06 04 00 12 23

Mail :
diets2956@gmail.com

ADFM
60, chemin de kervailant
29000 QUIMPER

Site web :
www.diets2956.jimdo.fr

VALEUR

Glycémie <0.6 g/l (être vigilant dès 0.8 g/l chez les personne âgée)

SIGNES

Malaise, pâleur, sueurs
Fatigue, chute, ralentissement physique ou excitation
Comportement inhabituel, confusion
Palpitations
Troubles visuels
Faim douloureuse

CAUSES

Trop d'insuline, repas insuffisant, alcool

PRISE EN CHARGE

Personne consciente :

1 petit verre (150 ml) ou ½ canette de boisson sucrée (non light) de type limonade, coca, ...
1 berlingot ou 1 verre de jus de fruits
3 morceaux de sucre dans une tasse de café ou de thé
1 à 2 cuillères à soupe de sirop de fruit, de type grenadine, diluée dans un ½ verre d'eau
A défaut de liquide, 4 tablettes de Dextro Energie® ou 1 cuillère à soupe de confiture ordinaire

Personne inconsciente :

Résident ne pouvant pas avaler : une ampoule de glucose 30% en IV lente
Résident sous insuline : une ampoule de Glucagen IM ou S/C ou 2 ampoules de glucose 30% en IV lente
Résident sous sulfamides : 2 ampoules de Glucose 30% en IV lente

Prévenir le médecin de permanence ou le 15 si résident inconscient ou si persistance d'un dextro < 0.7 g/l après resucrage per os